n° 4°.

Memoire en reponse a la question proposée au Journal du mois de mars 1732.

Les Tumeurs humoralles faites de sang, bille, pituitte, et melancolie plus ou moins partialisées de ces humeurs differentes lors quil ny a point denuelopes comme sacs membraneux ou Kistes et que les humeurs sont fluides je prefere louverture de Linstrument tranchant a celle du caustique a moins que la tumeur ne fut scituée dessus et pres quelque artere et que le volume de la tumeur fut peut considerable car en ce cas je preferois louverture du caustique a celle de linstrument tranchant crainte de louverture de lartere laction du caustique ce trouveroit éteint dans les matieres de la tumeur ce qui empecheroit dendommager Larlere ce qui pouroit arriver par Linstrument tranchant.

Mais si la tumeur est considerable par son volume en quelques partie que ce soit les arteres tandons et autres corps solides se trouveront elloignees en ce cas je prefere loperation de linstrument tranchant par ce que loperation est plus ~~emple~~ promte moins douloureuse et le malade sen trouve plutôt soulagé

Dans les Tumeurs ou il y a des envelopes ou Kistes qui renferment des humeurs ou matieres qui ont acquis de Lendurcissement soit quelles soient adherentes ou non elles doivent être extirpée avec instrument tranchant et leurs envelopes separee de touttes adherences

MICALLET ARC 13 d 12 n°. 12

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

a Lexception neanmoins Si jl y avoit fortes adherences aux —
Sutures du crane, pericrane, articulations ou pres dun gros —
artere en ces cas jl faut Sen abstenir il en arriveroit des —
accidents facheux comme Erresipel a toutte la teste, fievre
continüe hemoragie et autres qui pouroient causer la mort —
Si La tumeur quoy quen Kistés auec adherences aux —
Sutures du crane ou Située comme jl vient dêtre dit parois —
mole et les enuelopes ou Kistes minces on doit Se contenter —
dune Simple ouverture faite par instrument tranchant —
Sans extirpation de Ses adherences pour eviter les dangers —
qui arriueroient de Lextirpation il poura arriuer que par —
Louverture de Linstrument tranchant que le volume de —
la tumeur diminura que les enuelopes ou Kistes et adherences —
pouront Se detacher par Supuration; Il ne faut point dapplicaons
caustiques Sur les parties membraneuses qui ont adherences —
aux Sutures du crane, pericrane, ny aux autres articulaons —
ny pres dun gros vaisseau et particullierement dun artere —
Il en arriveroit de pernicieux accident comme ceux cy devant —
Dans la Tumeur du cancer non vlceré Il faut Lextirper
auec instrument tranchant auec Sureté dextirpation ou —
emputation de toutes Ses adherences Soit aux ós ou a touttes
autres parties il ne faut en cete tumeur Se Servir daucuns —
caustiques ils jrriteroient la tumeur jay reüssy en pareil
Tumeur par cette operation et lobservation des remedes. —
generaux, et regime de viure.

Dans touttes les tumeurs humoralles qui arrivent a
a la face comme au nez a la bouche aux oreilles aux joües
tant interieurement que exterieurement je prefere loperation
de Linstrument tranchant à celle du caustique qui doit
être entierement Suprimé pour deux Raisons 1°. a cause
de la laideur des cicatrices; 2°. crainte den dommager
Les parties cartilagineuses qui pourroient produire Ulcere
chancreux ce qui narriue pas par loperation de Linstrument
tranchant.

Aux tumeurs Venerienes appellée poulins
ie prefere louverture du caustique a celle de Linstrument
tranchant par ce que loperation du caustique est plus emple
dans Sa largeur procure une evacuation plus considerable
et le chirurgien contient plus facillement la tumeur ouverte
Jusqu'a Lentiere évacuation des humeurs Virullentes.
Au contraire Louverture tranchante tendant plus facillement
à la reunion il pouroit arriuer que pour être trop toi cicatricée
quelques particulles de lhumeur virullente Se trouvant enveloppés
dans quelques cellulles ou replis des teguments Se trouueroient
Voillées apres la reunion ou cicatrice fermée ce qui ne feroit
qune Cure palliatiue tres dangereuse

a Lexception neanmoins Si jl y avoit fortes adherences aux
Sutures du crane, pericrane, articulations ou pres dun gros
artere en ces cas jl faut Sen abstenir il en arriveroit des
accidents facheux comme Erresipel a toutte la teste, fievre
continüe hemoragie et autres qui pouroient causer la mort
Si La tumeur quoy quen Kistés avec adherences aux
Sutures du crane ou Située comme jl vient dêtre dit parois
mole et les envelopes ou Kistes minces on doit Se contenter
dune Simple ouverture faite par instrument tranchant
Sans extirpation de Ses adherences pour eviter les dangers
qui arriveroient de Lextirpation il poura arriver que par
Louverture de Linstrument tranchant que le volume de
la tumeur diminura que les envelopes ou Kistes et adherences
pouront Se detacher par Supuration; Il ne faut point dapplicaons
caustiques Sur les parties membraneuses qui ont adherences
aux Sutures du crane, pericrane, ny aux autres articulaons
ny pres dun gros vaisseau et particullierement dun artere
Il en arriveroit de pernicieux accident comme ceux cy devant
Dans la Tumeur du cancer non Vlceré Il faut Lextirper
avec instrument tranchant avec Sureté dextirpation ou
emputation de toutes Ses adherences Soit aux ós ou a touttes
autres parties il ne faut en cete tumeur Se Servir daucuns
caustiques ils jrriteroient la tumeur jay reüssy en pareil
Tumeur par cette operation et lobservation des remedes.
generaux, et regime de Vivre.

Dans touttes les tumeurs humoralles qui arrivent a
a la face comme au nez a la bouche aux oreilles aux joües
tant interieurement que exterieurement je prefere l'operation
de l'instrument tranchant à celle du caustique qui doit
être entierement suprimé pour deux Raisons 1°. a cause
de la laideur des cicatrices; 2°. crainte d'endommager
Les parties cartilagineuses qui pouvoient produire Ulcere
chancreux ce qui n'arrive pas par l'operation de l'instrument
tranchant.

Aux tumeurs Veneriennes appellée poulins
ie prefere l'ouverture du caustique a celle de l'instrument
tranchant par ce que l'operation du caustique est plus ample
dans sa largeur procure une evacuation plus considerable
et le chirurgien contient plus facillement la tumeur ouverte
Jusqu'a l'entiere évacuation des humeurs virullentes.
Au contraire l'ouverture tranchante tendant plus facillement
à la reunion il pouroit arriver que pour être trop tôt cicatricée
quelques particulles de l'humeur virullente se trouvant enveloppées
dans quelques cellulles ou replis des teguments se trouveroient
voillées apres la reunion ou cicatrice fermée ce qui ne feroit
qu'une Cure palliative tres dangereuse

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

[...] ma Conscience
[...]s experiences

Micallef

40 ß